

ミラノール使用方法についての説明書

ミラノールはむし歯予防の目的で開発されたフッ素洗口剤です。歯科医師の指導内容を守り正しく使用して下さい。

【使用方法】

専用のピンクの容器に水 200 ml を入れ、ミラノール 1 包〔フッ化ナトリウム 110 mg 含有〕を加えてよく溶かします。フッ素洗口液〔0.055% フッ化ナトリウム水溶液〕ができます。

毎日 1 回、子供 1 人に、未就学児〔6 歳未満〕は 5 ml、小学校 低学年〔1～3 年生〕は 7 ml、小学校 4 年生以上は 10 ml の洗口液を用い、1 分間〔少なくとも 30 秒以上〕洗口させて下さい。洗口方法は、添付の説明書を参照して下さい。

洗口後 30 分間は飲食をさせないで下さい。

【注意事項】

フッ素洗口は、4 歳児〔永久歯が生え始める前〕から中学 3 年生頃〔永久歯が生え揃い安定する時期〕まで、長期間継続して使用すると、永久歯のむし歯予防に大きな効果を上げることができます〔予防率 55%～80%〕。

ミラノールを溶解したフッ素洗口液は普通薬の濃度ですが、粉末のままでは劇薬に該当します。ミラノールの粉末の管理には十分注意し、子供の手の届かない所に保管して下さい。

ミラノールを溶解したフッ素洗口液は、冷蔵庫で保管して下さい。常温で保管すると、水が変質する場合があります。また、ピンクの容器は、洗口液を新しくつくる度ごとによく洗って、一度内部を乾燥させてからご使用下さい。容器が汚れていると、水が変質しやすくなります。

「フッ素入り歯みがき剤」や「歯科医院でのフッ素塗布」とミラノールを併用しても全く問題はありませぬ。むしろ相乗効果が期待できます。

添付の説明書をよく読んで使用して下さい。

群馬県甘楽郡甘楽町上野 3073-1〔〒370-2201〕

萩原 歯科 医院 萩原 吉 則

TEL 0274-74-3735

FAX 0274-74-6464